

Sơn Tây, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Số: 33/TB-TTĐVNN

THÔNG BÁO

Bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân và biện pháp phòng trừ

Hiện nay, lúa Xuân trà sớm giai đoạn cuối đẻ nhánh - phân hóa đồng; trà trung giai đoạn đẻ nhánh rõ; lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Bệnh đạo ôn đã phát sinh gây hại trên trà lúa Xuân sớm, tỷ lệ bệnh trung bình 0,5 -1% lá; cao 5 % lá; cục bộ ở >10% lá, bệnh cấp 1, cấp 3. Bệnh hại chủ yếu trên các giống lúa: Thái Xuyên, TBR225, Nếp 9603 (nếp nhung),... ở các xã, phường như: Xuân Sơn, Cổ Đông, Trung Hưng,...

Trong điều kiện thời tiết như hiện nay: Ẩm độ không khí cao, nhiệt độ 21 - 28°C, đêm và sáng có sương mù,... là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, lây lan mạnh, nếu không chủ động phòng trừ bệnh sẽ nhanh chóng lây lan trên diện rộng làm bộ lá lúa bị cháy gây thiệt hại lớn năng suất lúa.

Triệu trứng bệnh: Ban đầu vết bệnh trên lá chỉ là những chấm nhỏ, màu xanh xám, sau có dạng hình thoi đặc trưng, viền nâu, tâm màu xám trắng. Bệnh nặng các vết bệnh liên kết lại làm lá lúa bị cháy khô.

Biện pháp phòng trừ:

1. Kiểm tra, khoanh vùng các diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Chú ý các diện tích lúa cấy sớm và các giống lúa Nếp, TBR225, BC15, ĐB 18, Thiên ưu 8, nhóm giống lúa Japonica,... các diện tích lúa bón không cân đối thừa đạm, diện tích lúa ở ven các hàng cây,...

2. Tổ chức phun trừ bệnh đạo ôn lá, trên những diện tích lúa có > 5% số lá bị bệnh bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất *Tricyclazole*, *Propiconazole*, *Isoprothiolane*, *Trifloxystrobin*, *Propineb*,... (Flint Pro 648 WG, Filia 525 SE, Trizole 75 WP, Beam 75 WP, Bankan 600WP,...).

*** Lưu ý:**

- Các diện tích lúa nhiễm bệnh cần dừng bón phân đạm và phân bón qua lá.
- Đối với diện tích nhiễm đạo ôn lá nặng, cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày (hoặc sau khi phun thuốc xong gặp mưa cần phun lại ngay)
- Khi sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng kỹ thuật). Nên phun thuốc vào buổi chiều mát, phun đủ từ 25 - 30 lít nước thuốc đã pha/sào. Sau khi pha thuốc cần thu gom vỏ

bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để đúng nơi quy định để tránh ô nhiễm môi trường.

Đề nghị UBND xã, phường có sản xuất nông nghiệp cử cán bộ phối hợp với Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Sơn Tây tăng cường cán bộ kiểm tra đồng ruộng đến từng xứ đồng, từng trà lúa, kịp thời phát hiện các diện tích lúa nhiễm bệnh Đạo ôn; Thông báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh an toàn, hiệu quả, không để bệnh Đạo ôn gây hại lúa trên diện rộng.

Nơi nhận:

- Chi cục TTBVTV Hà Nội; (để b/c)
- UBND thị xã;
- UBND các xã, phường có SXNN;
- BGD Trung tâm;
- Lưu: VT, KTDV, Sự 02b.



Phùng Thị Thuận