

Số: /TB-TTĐVNN

Sơn Tây, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa Mùa cuối vụ và biện pháp phòng trừ

I. Tình hình sinh trưởng và sâu bệnh gây hại lúa

1. Tình hình sinh trưởng của lúa

Hiện nay lúa trà sớm chín sáp-chín, trà trung đòng già-chín sữa, lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tính đến ngày 30/8/2024 diện tích lúa trổ trên toàn thị xã là 435 ha; Ước diện tích lúa trổ sau ngày 5/9/2024 là 10,5 ha (xã Sơn Đông, Kim Sơn). Thời tiết trong thời gian tới tiếp tục có những diễn biến bất thường, nắng nóng xen kẽ, kèm theo các đợt mưa giông là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng như: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt,...phát sinh gây hại từ nay đến cuối vụ.

2. Tình hình sinh vật hại lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 đang ra rộ, mật độ trung bình 0,5-1con/m², cao 3con/m², trưởng thành tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non bắt đầu nở từ ngày 4/9, gây hại mạnh trên trà lúa trổ sau 5/9/2024 trở đi.

- Bọ rầy: Mật độ trung bình 30-50 con/m², cao >150 con/m², tuổi trưởng thành. Dự kiến rầy cám nở rộ từ 01/9-5/9/2024, gây hại mạnh trên trà lúa chín sữa - đò đuôi. (chú ý các ổ rầy vụ trước, giống nhiễm, cây dày, ruộng xanh tốt,...)

- Bệnh khô vằn: Tỷ lệ trung bình 5-10% danh, cao 15-20% danh, cục bộ >30% danh, phát sinh gây hại mạnh trên các diện tích lúa gieo sạ, cây dày, bón thừa đạm.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá: Tỷ lệ trung bình 5-7% lá, cao 10-15% lá, cục bộ >30% lá, tập trung các xã, phường Xuân Sơn, Đường Lâm, Thanh Mỹ, Trung Hưng,...

Ngoài ra chuột, bệnh đen lép hạt, lúa cỏ gây hại cục bộ.

II. Biện pháp phòng trừ

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Cần lưu ý các trà lúa trổ muộn, diện tích bón thừa đạm, ruộng xanh tốt,...Tổ chức phun phòng trừ các ổ những diện tích lúa có mật độ sâu từ >20 con/m², phun khi sâu tuổi 1, tuổi 2 (sau khi bướm ra rộ

5-6 ngày) bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất *Chlorantraniliprole*, *Isocycloseram*, *Abamectin*, *Emamectin benzoate*,... như: Voliam Targo 063SC, Incipio 200SC, Virtako 40WG, Prevathon 5SC, AcPlant 6EC,...

- Đối với bộ rầy: Tổ chức phun thuốc phòng trừ ở những diện tích lúa có mật độ bộ rầy >3.000 con/m², khi tuổi 1,2 bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất *Nitenpyram*, *Pymetrozine*, *Buproferin*, ... như Chess®50WG, Cheestar 50WG, Penalty 40WP, Orgyram 70WP, Facetime 750WP,...

- Đối với sâu đục thân hai chấm: Chú ý các các diện tích lúa trổ muộng sau 5/9, những ruộng ven làng, hàng cây, gần ánh sáng đèn, điển hình xã Sơn Đông, Kim Sơn, phường Phú Thịnh,.... Phun phòng trừ bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất *Chlorantraniliprole*, *Isocycloseram*,... như: Voliam Targo 063SC, Incipio 200SC, Virtako 40WG.

- Đối với bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Lưu ý các giống nhiễm như TBR225, TBR45, lúa thơm, lúa lai,...những diện tích lúa bị nhiễm bệnh cần giữ nước thường xuyên trên ruộng từ 3-5cm, để tăng khả năng chống chịu của cây. Phun phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất *Bismertiazol*, *Copper Oxychloride*, *Bronopol*,...như: Xanhthomix 20WP, Riazor 215WP, New Kasuran 16.6WP, Totan 200WP,...

Ngoài ra kết hợp phòng trừ bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt hại lúa bằng một trong các loại thuốc BVTV chứa hoạt chất *Hexaconazole*, *Validamycin-A*,... như: Anvil 5SC, Validacin 5SL, Tilt Super 300EC, Nevo 330EC,...

Chú ý: Sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc 04 đúng. Pha thuốc theo đúng hướng dẫn ghi trên bao gói và phun đủ 24-30 lít nước thuốc đã pha/sào. Sau khi pha thuốc đề nghị nông dân cần thu gom vỏ bao gói để đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi ngoài đồng ruộng.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND xã, phường quan tâm, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh hại lúa Mùa từ nay đến cuối vụ kịp thời, hiệu quả, giảm thấp nhất thiệt hại, bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa năm 2024./.

Nơi nhận:

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; | (đề b/c)
- UBND thị xã;
- UBND các xã/phường;
- BGD Trung tâm;
- Lưu: VT, KTDV, S.02b.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phùng Thị Thuận